


Gelincikler ön tanı çalışması ;

Gelinciklerin ayrımı biz kelebek gözlemcileri için en zorlu konulardan biridir. Hatta birçok bölge ve birey için net tanı vermek gerçekten çok zor hatta imkansız . Bu konuda uzun süre çaba harcadık. En belirgin fark tesbiti sayın Mehmet Karababa dan gelmişti. Burada da onun kriteri ile durumu biraz izah etmeye veya kolaylaştırmaya gayret edeceğim ama bu konunun net olmadığını , bazı bireylerin kriterleri zorladığını ve tanımlarda hata olabileceğini en baştan belirtmek isterim.

Akbes Gelinciği (*Tomares nesimachus*)



-Beyaz ok ile işaretli gördüğümüz gri alan Akbes Gelinciği'nde dar ve kısa iken , Anadolu gelinciğinde geniştir ve birçok bireyde arka kanada doğru iner. Bunun tam tersini kırmızı alanlar için de söyleyebiliriz. Bu DTD örneklerinin de çok büyük bir kısmında mevcut.

-Arka kanat mavi pul miktarının ise net bir ayrım kriteri olmadığını düşünüyorum.

-Dağılıma gelince Ege kıyı şeridi ve Güneydoğu Anadolu güney illeri için faydalı olabilir ancak diğer bölgelerde ortak alanda uçuyorlar.

- Son olarak uçuş zamanındam bahsetmekte fayda var. Akbes Gelinciğinin birlikte uçtukları bölgelerde daha erken uçtuğunu (yüksekliğe göre Mart-Nisan- Mayıs) , Anadolu gelinciğinin ise bunu takiben sahada yerini aldığını (Mayıs - Haziran) söylemek mümkün.

Anadolu Gelinciği (*Tomares nogelii*)



Bu türlerde kanat üstü ise daha net bir kriter sağlıyor ancak canlı bireyde uçar dışında bunu yakalamak imkansızdır. Yine de alabilerseniz; Akbes gelinciği kanat üstü hem ön hem arka kanatta kırmızı alanlar içerirken ,



Anadolu Gelinciğinde ise ön kanatta az arka kanatta ise yok denilecek kadar veya hiç kırmızı alan yoktur.

Kafkasya Gelinciği (*Tomares callimachus*)

Dağılımı ve arka kanatta turuncu benek içermeyen yapısı ile ayrımı kolaydır.



Romanov Gelinciği (*Tomares romanovi*)

Arka kanadı ve ön kanat apeksi yoğun mavi pul içerir. Hatta arka kanadı tamamen mavi pullarla kaplıdır ancak bazı bireylerde çok az sayıda turuncu benek görülebilir. Yine dağılımı da önemlidir.



Romen gelinciği (*Tomares dobrogensis*)

Bazı uzmanlarca *T.nogelii* (Anadolu gelinciği) nin alt türü kabul edilmektedir.

İlk etapta büyüklüğü ve düz /temiz zemin rengi ile dikkat çeken keleşimizin elde bulunan az sayıdaki kaydında ön kanatta turuncu kısmının oldukça az olduğu da dikkat çekmektedir.

